



ประกาศสภาการพยาบาล

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อการเตรียมฉีดวัคซีนชนิด Multiple dose ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด - 19

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในสถานการณ์แพร่ระบาดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สภาการพยาบาลเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการเตรียมวัคซีนชนิด Multiple dose เพื่อการบริหารยาในขั้นตอนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. เตรียมสถานที่ บริเวณหรือพื้นที่ที่จัดเตรียมวัคซีนให้สะอาด
2. ผู้เตรียมวัคซีน ใส่หน้ากากอนามัยที่แนบใบหน้า ทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่ หรือ 70 % Alcohol hand rub สวมกาวน์พลาสติกกันน้ำแขนยาวทับชุดที่สวมใส่ สวมหมวกคลุมผม และสวมถุงมือสะอาด
3. เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ ถาดเตรียมยาที่ติดชื่อวัคซีนกำกับ Syringe ขนาด 1 ml เข็มสำหรับดูดวัคซีน เบอร์ 21-25 เข็มสำหรับฉีดวัคซีน เบอร์ 25 ความยาว 1 นิ้ว สำลีแอลกอฮอล์ และกล่องปลดหัวเข็ม
4. เตรียมและตรวจสอบความพร้อมใช้ของวัคซีน ได้แก่ สภาพขวดวัคซีน ลักษณะของน้ำยาวัคซีน และวันหมดอายุ
5. ใช้ Aseptic technique ในการเตรียมวัคซีน เปิดฝาขวดวัคซีน เช็ดจุกยางด้วยแอลกอฮอล์ 70% ใช้เข็ม เบอร์ 21-25 แทนที่จุกยางโดยทำมุม 90 องศากับขวดวัคซีน ห้ามเขย่าขวดวัคซีน

6. ปรับระดับปลายเข็มให้อยู่ได้ระดับน้ำยาวัคซีน กรณี dose วัคซีนกำหนดให้เป็น 0.5 ml เช่น AstraZeneca ให้ดูดวัคซีนให้ได้ปริมาณ 0.5 ml ต่อ dose ตรวจสอบปริมาณวัคซีนใน syringe ให้ได้ 0.5 ml ปลด syringe แล้วสวมเข็มสำหรับฉีดวัคซีนเบอร์ 25 และวาง syringe ในถาดเตรียมยาที่เขียนชื่อวัคซีนกำกับไว้ กรณีวัคซีนชนิดอื่น ต้องดูดวัคซีนให้ได้ปริมาณตามที่คุณผลิตกำหนดไว้
7. สวม syringe ที่จะเตรียมวัคซีนใน dose ถัดไป เข้ากับเข็มดูดที่แทงค้างไว้กับขวดวัคซีน ทำซ้ำในข้อ 6 จนกระทั่งวัคซีนหมดขวด หากวัคซีนที่เหลือในขวดมีปริมาณไม่ถึง dose ที่กำหนด ต้องไม่ดูดมาใช้ และห้ามนำไปผสมกับวัคซีนในขวดอื่น เช่น วัคซีน AstraZeneca dose ที่ผู้ผลิตกำหนด คือ 0.5 ml ดังนั้นหากวัคซีนที่เหลือในขวดมีปริมาณไม่ถึง 0.5 ml ต้องไม่ดูดมาใช้ และห้ามนำไปผสมกับวัคซีนในขวดอื่น
8. วัคซีนใน syringe ที่เตรียมฉีด และวัคซีนที่เหลือในขวด ต้องใช้ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากนำวัคซีนออกจากตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ
9. เก็บขวดวัคซีนที่ใช้แล้ว ในอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 7 วัน เพื่อการทวนสอบกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สภาการพยาบาล



สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

88/20 อาคารนครินทร์ศรี ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-596-7500 โทรสาร 02-589-7121